



מיועד לבעלי רישיון לשימוש בקנביס רפואי בלבד
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במוצר
אין להשתמש במוצר זה בחושך

שלם הפשטות והקלות הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך המוצר מיועד לשני המינים
עלון מידע למטופל - תפרחות קנביס רפואי לשימוש בשאיפה (עישון/אידיז)

טבלת מוצרים – תפרחות קנביס רפואי* (IMC - Medical Grade):

קבוצה	קטגוריה	THC	CBD	**CBN
מאוזן	קנביס רפואי T10/C10	10% (6%-14%)	10% (6%-14%)	0% (עד 1.5%)
עשיר ב-THC	קנביס רפואי T10/C2	10% (6%-14%)	2% (0%-3.8%)	0% (עד 1.5%)
	קנביס רפואי T15/C3	15% (11%-19%)	3% (0%-5.5%)	0% (עד 1.5%)
	קנביס רפואי T20/C4	20% (16%-24%)	4% (0%-7%)	0% (עד 1.5%)

*נרכים אלו משמשים לחלוקה לקטגוריית המוצרים, בהלימה עם הגדרות הסוכנות הממשלתית לקנביס רפואי במשרד הבריאות (היק"ר). ריכוזי החומרים בפועל מופיעים על גבי האריזה ובסריקת קוד QR. **CBN (cannabinol) הוא תוצר פירוק של THC ומעיד על התיישנות המוצר.

חומרים פעילים: תפרחת קנביס מכילה חומרים פעילים בשם קנבינואידים. על פי הידוע כיום, החומרים בעלי הפעילות הרפואית המשמעותית והנחקרת ביותר מבין מאות רכיבי צמח הקנביס הנם:

- CBD (Cannabidiol)
- THC (Tetrahydrocannabinol)

ובהתאם לכך, ריכוז חומרים אלו מצוין על גבי האריזה ובאתר האינטרנט של החברה (באמצעות סריקת קוד QR).

יודעים גם מרכיבים נוספים בצמח הקנביס, כדוגמת טרפינים, פלבנואידים, וקנבינואידים נוספים, אולם הידע המתקדם על השפעתם הפרמקולוגית מועט יותר. המוצרים מותאמים לכל מטופל על פי מצבו הרפואי, אחוזי החומרים הפעילים ואופי הזן (סאטיבה, אינדיקה או היברידי).

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במוצר. עלון זה מכיל מידע המצייני על המוצר. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הצוות הרפואי. עלון זה אינו מהווה תחליף לשיחה עם רופא או ליעוץ רוחקי.

מוצר זה נרשם עבורך ואין להעבירו לאדם אחר.

בהעברת המוצר לאחרים, הוא עלול להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

כמו כן, מסירת המוצר לאדם אחר הינה פלילית, ועלולה

הסתיים בשלילת הרישיון.

רישיון לקנביס רפואי רק למטופלים שנמצאים במעקב רפואי. שים לב, נטילת המוצר לרבות מקום השימוש, הינה בהתאם לתנאי הרישיון הרפואי שהוענק לך.

למי מיועד קנביס רפואי?

לקנביס רפואי התוויות הרפואיות מאושרות תחת הסיטיגויות לרנבניות כפי שהוגדרו ופורטו בבוהל 106 על ידי הסוכנות הממשלתית לקנביס רפואי במשרד הבריאות. לרוב, הטיפול מאושר רק לאחר מיצוי הטיפולים המקובלים.

לפני השימוש בקנביס רפואי

- אין להשתמש במוצר אם:**
 - אתה הגיש (אלרגי) לקנביס.
 - הנך בהריון, מתכננת הריון, או מיניקה.
 - אתה או מישהו מבני משפחתך (קרוב מדרגה ראשונה) בעל רקע של מחלות פסיכיאטריות
 - יש לך היסטוריה של התמכרות או שימוש לרעה בסמים (לרבות קנביס) או אלכוהול.

- תרופות נוגדות פרוכוסים (תכשירים אנטיאפילפטיים).
- נגדי קרישה מסוג ורפרין (קומדין) - יש לעקוב אחר מדד INR בדם.
- תרופות להגברת האון המיני.
- תרופות נוגדות זיהומים (כגון אנטיביוטיקה מסוג מקרוליידים, תכשירים אנטיפטיריטיים, אנטייראלים כולל HIV).

מומלץ להגיע לאיזון תרופתי בטיפול כרוני טרם התחלת השימוש, אין לשנות מינון או להפסיק טיפול תרופתי ללא התייעצות עם הרופא המטפל.

שימוש במוצר ומזון:

- אין לטול קנביס על בטן ריקה. הדבר עלול לגרום לסחרחורת מעקב ירידה ברמת הסוכר בדם בעקבות נטילת הקנביס.
- מומלץ לאכול מעט, כחצי שעה **לאחר** נטילת הקנביס.
- מומלץ להימנע מצריכת אשכוליות טרם תחילת הטיפול ובמהלכו.

שימוש במוצר וצריכת אלכוהול:

אין לשנות משקאות חריפים במהלך הטיפול. הסיכוי לתופעות לואו כגון ישנוניות, סחרחורת ואיבוד שיווי משקל יתגבר, וכך גם הסיכון לתאונות ונפילות.

עישון:

לא מומלץ לערבב קנביס רפואי עם טבק.

הריון והנקה:

- אין להשתמש במוצר בזמן הריון או בהנקה, חלק ממרכיבי הקנביס עוברים בחלב האם.
- קנביס עלול לפגוע בפריון בקרב נשים וגברים.

נהיגה ושימוש במכוונות:

מוצר זה עלול לגרום לתופעות לואו כגון סחרחורת, ישנוניות, איבוד שיווי משקל וחוסר ריכוז ובקואורדינציה. יש לפעול בהתאם להוראות הנהיגה ושימוש במכוונות על פי פקודת ותקנות התעבורה בישראל.

ביצד השימוש במוצר?

כיצד להשתמש במוצר בהתאם להוראות הצוות הרפואי. מינון התרופה הנו אישי ונדרש ניטור ועלייה הדרגתית במינון עד השגת איזון בין המינון המינימלי המאפשר תועלת רפואית ומיעוט תופעות לואו.

אופן השימוש: המוצר ניטל בשאיפה ע"י אידיז במכשיר מתאים, או ע"י עישון.

- יש ליטול את המנה המומלצת בשאיפה לאחר ארוחה קלה (פרי/כריך) על מנת למנוע ירידה ברמות הסוכר.
- ההשפעה מהירה - תוך מספר דקות.
- נדאי ללגום שתייה קלה בין שאיפה לשאיפה, להקלה על הצריבה בגרון.
- ללקח כ 3-4 פעמים ביום בדרך כלל, מספר השאיפות בכל נטילה עשוי להשתנות בהתאם למצב רפואי.
- חשוב להקפיד על רצף טיפול, גם אם ההשפעה אינה מספקת בתחילת הטיפול.
- מומלץ להתחיל את השימוש בקנביס רפואי בבית, באווירה גועה ויניחה, רצוי בנוכחות מבוגר אחראי נוסף.

אין לעבור על המנה המומלצת. אין לשנות את המינון מבלי להיוועץ בצוות רפואי. **אין ליטול מוצר זה בחושך!**
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול לחוות תופעות של הרעלה כגון סחרחורת, ישנוניות, בלבול והזיות.
אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע את המוצר ילד או כל אדם אחר, פנה מיד לרופא או לחדר מיון והבא עמך את אריזת המוצר. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
אם שכחת ליטול מנה בזמן המיועד אין ליטול מנה כפולה! קח את המנה הבאה בזמן המיועד תוך שמירה על הוראות הרופא.

הפסקת שימוש: יש להיוועץ ברופא לפני החלטה על הפסקת שימוש בקנביס, לאחר שימוש ממושך. הפסקת השימוש תעשה בצורה הדרגתית, בכדי להימנע מתופעות גמילה כגון עצבנות, דכאון, חרדה, רעד, צמרמורות, קשיי ריכוז, נדודי שינה או סיוטים, כאבי בטן, שינויים בתאבון. במידה והפסקת השימוש היא זמנית, וברצונך לחזור ולהשתמש במוצר, התייעץ עם הרופא לגבי אופן התחלת הטיפול מחדש והתאמת המינון **אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**
תופעות לואו:
קנביס, בדומה לתרופות, גורם לתופעות לואו אצל חלק מן המשתמשים. רוב תופעות הלואו יספקו לאחר הסתגלות ראשונית למוצר או לשינוי במינון. אל תיבהל למקרא שימת תופעות הלואו, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש מיד בהופעת תופעות אלו, ולפנות בדחיפות לרופא או לחדר מיון בבית החולים:

- תגובה אלרגית.
- בלבול, התקף חרדה חריף, התפרצות אירוע פסיכזטי, הזיות.

תופעות לואו שכיחות:

עייפות, ישנוניות, סחרחורת, דופק לא יציב (מואץ או איטי), ירידה ברמת הסוכר בדם, ירידה בלחץ הדם – ייתכן צורך בהתאמת מינוני התרופות הנלקחות למטרות אלו. קואורדינציה לקויה וחוסר יציבות, פגיעה בריכוז ושינויים בתפיסת זמן ומרחב, מצבי חח משתנים, אופוריה או חרדה, שיעול ויובש בגרון, יובש ואדמומיות בעיניים, שינוי בתאבון, כאבי ראש, כאבי בטן או בחילות.

תופעות לואו ישימוש לטווח ארוך:

התמכרות, ברובניטיס כרוני או פגיעה בתפקוד ריאתי, שינויים הורמונליים (כגון פרולקטין, FSH, LH, GH) הפרעות במאזן האלקטרוליטים (ביחוד בקשישים), הזירות נדרשת בחולי אי ספיקת כליות, הפרעות פסיכוטיות (בעיקר בבעלי רקע משפחתי).

תופעות לואו הנובעות בדרך כלל ממינון יתר ומחייבות

התייחסות מיוחדת:

שינויים משמעותיים בלחץ הדם, קצב הלב, קצב הנשימה ורמות הסוכר בדם. כתוצאה מכך, תופעות כמו סחרחורת, שטטוש, בלבול, הזיות, חרדה, בחילות, הקאה, הזעה, רעד וחולשה עלולות להופיע, ולפעמים אפילו עלפון.

במקרים מסוימים, אצל אנשים עם נטייה מוקדמת לכך, מינון יתר עלול לגרום להתפרצות זמנית פסיכוטית או הזיות.

במידה ואתה חווה תופעות מינון יתר כמתואר למעלה, מומלץ לצרף מעט סוכר ולשכב לנוח.

צור קשר עם הרופא לגבי הצורך בהתאמת המינון מחדש. **אם הופיעה תופעת לואו שאינה מצוינת בעלון, או שתופעת הלואו מחמירה או אינה חולפת - התייעץ עם הצוות הרפואי.**

איך לאחסן את המוצר?

מנע הרעלה! מוצר זה יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות.

אין להשתמש במוצר זה לאחר תאריך התפוגה. תאריך זה מתייחס ליום האחרון בחודש המצוין על גבי האריזה.

אין להשליך מוצר זה לפח. התייעץ עם הרוקח לגבי אופן סילוק הקנביס.

תנאי אחסון: יש לאחסן מוצר זה במקום קריר (בטמפרטורה של עד 25°C), יבש ומוגן מאור.

החזקה ומקום שימוש:

בהתאם לתנאי הרישיון והתקנות השימוש של היק"ר. וודא שרישיונך עמך, ואיך משתמש במוצר בנוכחות קטנים. חל איסור על נשיאת המוצר לחו"ל למעט באישור מיוחד בכתב.

מידע נוסף:

תפרחות מייבשות של קנביס רפואי ארוכות בכמות של 10 גרם לאריזה.

אין להשתמש במוצר במידה ובעת רכישת המוצר קיימת עדות לפתיחה ראשונית או נזק לאריזה.

טבלת מקרא לסמלילי משרד הבריאות

תחום	משמעות	סמליל
הורדת עומס מיקרוביאלי	הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פסטור קר" (הקרנה בקרינת בטא)	
הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות קרינה	הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות אלקטרומגנטית (הקרנה בקרינת גמא)	
הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פלזמה קרה"	הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות "פלזמה קרה"	
הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות אוזון	הקנביס עבר הליך הורדת עומס מיקרוביאלי באמצעות אוזון	
הדברה	בעת גידול הקנביס בוצע שימוש בתכשירים כימיים מורשים	
	בעת גידול הקנביס בוצע שימוש בחומרי הדברה המותרים	
	בעת גידול הקנביס בוצע שימוש בחומרי הדברה המותרים	
	בעת גידול הקנביס לא בוצע כל שימוש בחומרי הדברה	
חישוב אחוז החומרים הפעילים	אחוז החומרים הפעילים חושב על בסיס בדיקת אובדן חומר בייבוש Loss on Drying	
	אחוז החומרים הפעילים חושב על בסיס בדיקת טיטרצית קארל פישר (Karl Fischer)	

יצרן: שיח פארמה, נתניה

קוד עוסק: 01062023-3133-M

אתר אינטרנט: www.seach.co.il

מספר טלפון שירות לקוחות: *2084

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ביולי 2023

For use only by permit holders only
Read the leaflet carefully to the end before using this product.

Do not take this product in the dark
for simplicity and ease of reading this leaflet is worded in masculine language, nevertheless the product is intended for both genders.

Patient Information Leaflet – Medical Cannabis Inflorescence for Inhalation (Vaporization / Smoking)
Products Table - Medical Cannabis Inflorescences* (IMC – Medical Grade)

Group	Category	THC	CBD	CBN**
Balanced	Medical Cannabis T10/C10	10% (6%-14%)	10% (6%-14%)	0% (Up to 1.5%)
	Medical Cannabis T10/C2	10% (6%-14%)	2% (0%-3.8%)	0% (Up to 1.5%)
THC Rich	Medical Cannabis T15/C3	15% (11%-19%)	3% (0%-5.5%)	0% (Up to 1.5%)
	Medical Cannabis T20/C4	20% (16%-24%)	4% (0%-7%)	0% (Up to 1.5%)

* These values are used for product categorization, in accordance with the definitions set by the Israeli Medical Cannabis Unit in Ministry of Health (IMC). The actual material concentrations appear on the packaging and upon scanning the QR code.

** CBN (cannabinol) is a degradation product of THC and indicates aging of the product.

Active Ingredients: The cannabis inflorescences contain active substances called cannabinoids. According to current knowledge, the substances with the most significant and studied medical activity among the hundreds of components of the cannabis plant are:

- CBD (Cannabidiol)
- THC (Tetrahydrocannabinol)

As such, the concentration of these materials is indicated on the packaging and on the company's website (by scanning the QR code).

Other components of the cannabis plant are also known, such as terpenes, flavonoids, and other cannabinoids, however there is less research-based knowledge on their pharmacological effect. The products are adapted to each patient according to his medical condition, the percentage of active ingredients and the nature of the strain (sativa, indica or hybrid).

Carefully read the leaflet to the end prior to using the product. This leaflet contains summarized information about the product. If you have further questions, contact the medical staff. This leaflet does not substitute a conversation with a doctor or pharmacist consultation.

This product was prescribed only for you, do not hand it to another person. Handing this product to another person may hurt them, even if their medical condition is similar to yours.

Additionally, delivery of this product to another person is a criminal act and may result in suspending your license. License for medical cannabis is only granted for patients who are under medical surveillance.

Note that taking the product, including the place of use, is in accordance with the terms of the medical license granted to you.

To whom the product is for? Medical Cannabis indications are as defined by the Government Agency for Medical Cannabis Unit, as specified in the 106 Ministry of Health Procedure. In most cases, the treatment is approved only after the conventional treatments have been exhausted.

Before using medical cannabis

Do not use this product if

- You are sensitive (allergic) to cannabis.
- you are pregnant, planning a pregnancy, or breastfeeding.
- you or a first-degree relative have a history of psychotic disorders.
- you have a history of addiction or drug-abuse (including cannabis) and alcohol.

Special warnings/precautions related to product use:

- If you feel the need to increase amounts of cannabis to relieve symptoms (tolerance/ addiction), consult your doctor.
 - For diabetics, hypoglycemia may be triggered by cannabis, it is advised to have a snack or sweetened soft drink within reach.
 - Before blood tests and surgeries (including dental), tell your doctor that you are taking medical cannabis.
 - Older adults may be more sensitive to the neurological, psychoactive and postural hypotensive effect of THC.
 - Patients that suffer from liver cancer (Hepatoma) are advised not to use THC containing products.
- Use of children:** This product is not intended for children and adolescents under the age of 18.
- Use in the elderly:** Elderly people may be more vulnerable to side effects such as dizziness, fatigue, loss of concentration etc. It is recommended to be careful in the transition from lying down or sitting to standing position, and to be extra careful when there is a danger of falls or accidents.

Tests and follow up: Medical Cannabis license is conditioned by being provided with medical surveillance of the attending physician whose details appear on the license. If you take other medicines, follow up tests are advised: liver function and drugs level in blood (Tacrolimus, Valproate) or effects (Coumadin-INR) during combined treatment with medical cannabis.

Drug interactions:

If you are taking, or have been taking until recently, medicines or food supplements, tell your doctor or pharmacist prior to using this product. It may be necessary to adjust the dose due to a cumulative or opposite effect or an effect on the removal of the drug from the body:

- Medicines that affect the central nervous system, for example narcotic products for pain relief (such as opiates), medicines for the treatment of sleep disorders, medicines for the treatment of depression and anxiety or psychosis (such as benzodiazepines, hypericum - St. John's Wort, tricyclics, phenothiazines), products for weight loss or for the treatment of attention disorders (Amphetamines and their derivatives). It is possible to increase the effect of the effect on the heart rate, sedation, dizziness, loss of balance and risk of falling, increased risk when

operating machinery and driving.

- Medications to lower blood pressure or to treat diabetes.
- Anti-allergic drugs for systemic or local use (such as antihistamines).
- Muscle relaxants enhancement of the effect may occur.
- Medicines with a symptomatic effect, including products for local use (such as medicines to lower intraocular pressure or nasal drops).
- Anticonvulsant drugs (antiepileptic drugs).
- Anticoagulants of the warfarin type (Coumadin) - the INR index in the blood must be monitored.
- Sex-enhancing drugs.
- Anti-infective drugs (such as macrolide antibiotics, antifungal products, antivirals including HIV).

It is recommended to reach a medicinal balance in chronic treatment before starting use, do not change dosage or stop medicinal treatment without consulting the attending physician.

Product use and food:

Do not take cannabis on an empty stomach. This may cause dizziness as a result of blood sugar level decrease following cannabis consumption. A little meal about 30 minutes after taking cannabis is recommended. It is recommended to avoid consuming grapefruit before and during treatment.

Product use and alcohol consumption:

Do not drink wine or alcoholic beverages during treatment, the chance of side effects such as drowsiness, dizziness and loss of balance will increase, and so will the risk of accidents and falls.

Product use and smoking:

Mixing Cannabis with tobacco is not recommended.

Pregnancy and breastfeeding:

- Do not use the product during pregnancy or lactation, some of the cannabis components pass through breast milk.
- May impair fertility in both men and women.

Driving and using machines:

This product may cause side effects such as dizziness, drowsiness, loss of balance and lack of concentration and coordination. One must act in accordance with the instructions for driving and using machines according to the traffic ordinance and regulations in Israel.

How to use the product?

Always use this product according to your medical staff instructions. Doses are highly individualized, to avoid having unpleasant side effects, it is best to start at a low dose and then increase the dose slowly over time until obtaining the dose in which symptoms are relieved, and the side effects are minimal.

Way of use: The recommended dose should be taken by inhalation or smoking.

- The recommended dose should be taken after a light meal (fruit/sandwich) to prevent a drop in sugar levels.
- The effect may be quick - in a few minutes.
- Advisable to sip a light drink between inhalations, to relieve the burning sensation in the throat.
- Product should be taken about 3-4 times a day usually, the number of inhalations in each intake may vary depending on the medical condition.
- It is important to maintain a continuous treatment and monitoring, even if the effect is not sufficient at the beginning of treatment.
- start treatment at calm atmosphere, at home and in the presence of another responsible adult.

Do not exceed recommended dose. Adhere to the treatment as recommended by your doctor.

Do not take this product in the dark!

If you have accidentally taken a high dosage, you may experience dizziness, sleepiness, confusion or hallucinations.

If you have taken overdose, or if a child or any other person has accidentally swallowed the product, contact a doctor or emergency room immediately and bring the product package with you. Do not induce vomiting without clear medical advice.

If you forgot to take your dose at the scheduled time do not take double dose! take the next dose at regular time and consult your doctor.

Discontinuation of use: Consult your physician before deciding to stop using cannabis. Discontinue treatment gradually to avoid withdrawal symptoms such as irritability, depression, anxiety, agitation, tremor, chills, difficulty concentrating, insomnia or nightmares, abdominal pain, changes in appetite. If stopping use is temporary, and you want to use the product again, consult your doctor or pharmacist about how to start treatment again. **If you have further questions regarding the use of the medicine, consult a doctor or pharmacist.**

Side effects: Cannabis, like medicines, causes side effects in some users. Most of the side effects will stop after an initial adaptation to the product or a change in dosage. Do not be alarmed by the list of side effects, you may not suffer from any of them.

Discontinue use as soon as these symptoms occur, and consult a physician or emergency room at the hospital urgently:

- Allergic reaction.
- Confusion, acute anxiety attack, outbreak of psychotic event, hallucinations.

Common side effects: Fatigue, drowsiness, dizziness, instable heart rate (accelerated or reduced heart rate), decreased blood sugar levels, decreased blood pressure - it may be necessary to adjust the doses of medications taken for these purposes, poor coordination and instability, impaired concentration or perception of space-time, mood swings, euphoria or anxiety, cough and dry throat, eyes dryness and redness change in appetite, headaches, abdominal pain or nausea.

Long-term side effects: addiction or dependence, chronic bronchitis or impaired lung function, hormonal change (such as prolactin, FSH, LH, GH), disorders in the electrolyte balance (especially in the elderly), caution is required in patients with kidney failure, psychotic disorders (especially in those with a family background).

Side effects that usually result from an overdose and require special attention:

Significant changes in blood pressure, heart rate, breathing rate and blood sugar levels. As a result, symptoms such as dizziness, blurriness, confusion, hallucinations, anxiety, nausea, vomiting, sweating, tremors and weakness may appear, and sometimes even fainting.

In some cases, in predisposed individuals, an overdose may cause a temporary psychotic episode or hallucinations.

If you experience overdose symptoms as described above, it is recommended to consume a little sugar and lie down to rest.

Contact the physician regarding the need to readjust the dose.

If a side effect appears that is not specified in the leaflet, or if the side effect worsens or does not go away - consult the medical team.

How to store the product?

- Prevent poisoning! This product should be kept out of the reach of infants or children.
- Do not use this product after the expiration date which refers to the last day of the month indicated on the package.
- Do not discard a cannabis product to the waste or wastewater. Consult a pharmacist regarding disposal.
- Storage conditions: Store in a cool (up to 25°C), dry place protected from light.

Place of storage and use: In accordance with the terms of the license and the applicable regulations of the IMC. Make sure that you have your license with you, and that you do not use the product in the presence of minors. It is prohibited to carry the product abroad except with special written permission.

Additional Information:

10-gram package of Medical Cannabis Dried Inflorescences.

Do not use the product if there is evidence of tamper or damage to the package.

Ministry of Health Icons:

Icon	Meaning	Function
	The cannabis underwent a bioburden reduction procedure using "cold pasteurization" (beta radiation)	Bioburden Reduction
	The cannabis underwent a bioburden reduction procedure using electromagnetic irradiation (gamma radiation)	
	The cannabis underwent a bioburden reduction procedure using "cold plasma"	
	The cannabis underwent a bioburden reduction procedure using ozone	
	During cannabis growth, approved chemical products were used	Pesticides
	During cannabis growth, biological pesticide was used (beneficial organisms)	
	During cannabis growth, only pesticides permitted in organic agriculture were used	
	During cannabis growth, no pesticides were used	
	The percentage of active ingredients was calculated on the basis of material Loss on Drying	Active Ingredients Calculation
	The percentage of active ingredients was calculated on the basis of Karl Fischer titration	

Manufacturer: Seach Pharma, Netanya

License Code: M-3133-01062023

Website: www.seach.co.il

Customer Service Phone Number: *2084

This leaflet was reviewed and approved by Ministry of Health in July 2023